



Korbblütler, Baldriangewächse	frühestes Aussaatdatum			Spätestes Aussaatdatum			Dauer Keimung							Dauer Aussaat bis Pflanzung							Dauer Pflanzung bis Ernte							Dauer Aussaat-Ernte						
	Jan./Feb.	März/Apr.	Mai	Juni	Juli	August	Jan./Feb.	März/Apr.	Mai	Juni/Ju.	August	Sept.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.								
<b>Kopfsalat</b>	15.1	15.7	3-5																															
<b>Eisberg</b>	15.1	15.7	3-5		7W	6-7W	4-6W	3-5W	3-4W				9-12W	8-10W	6-8W	6-8W																		
<b>Batavia</b>	15.1	1.8	3-5		7W	6-7W	4-6W	3-5W	3-4W				8W	7W	5-6W	5-7W																		
<b>Lattich</b>	15.1	15.7	3-5		7W	6-7W	5-6W	4-5W	4-5W				10W	8-10W	6-8W	6-10W																		
<b>Lollo</b>	15.1	1.8	3-5		7W	5-7W	4-5W	3-4W	3-5W				6-7W	5-6W	4-5W	4-6W																		
<b>Eichblatt</b>	15.1	15.7	3-5		7W	5-7W	4-5W	3-4W	3-5W				8W	6-7W	5W	5-7W																		
<b>Schnittsalat</b>	1.3	15.8	3-5																	5-6W	5-6W	4-5W	4-5W	3-4W	3-4W									
<b>Endivie</b>	1.2	31.7	5-8		8W	6-7W	5-6W	4W					7-8W	6-7W	8-9W	8-10W																		
<b>Chicoréewurzel</b>	28.4	30.5	8-10																			20-24W												
<b>Gcorino/Radicchio</b>	15.3	15.7	5-8		5-6W	5W	4W	3-4W					7-8W	6-7W	8-9W	8-10W																		
<b>Zuckerhut</b>	1.2	30.6	5-8		6W	5-6W	5W	3-4W					8W	7-8W	6-7W	8-10W																		
<b>Schwarzwurzel</b>	25.3	5.4	14																		7Mt													
<b>Nüssli-salat</b>	1.3	15.9	8-14		5-6W	5-6W	5W	5W	5-6W				5-6W	5-6W	5-6W	5-6W				10W	10W	9W	8-9W	8W	8-10W	10-25W								

→ Rote Salate brauchen im Durchschnitt eine Woche länger bis zur Ernte.

Leguminosen	frühestes Aussaatdatum			Spätestes Aussaatdatum			Dauer Keimung			Dauer Aussaat bis Pflanzung				Dauer Pflanzung bis Ernte				Dauer Aussaat-Ernte			
	Jan./Feb.	Mär./Apr.	Mai	Juni	Juli	August	Mär./Apr.	Mai	Juni/Juli	August	Sept.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.			
	Buschbohnen	10.5	15.7	10-14											60-80	60-80	60-80				
Stangenbohnen	15.5	1.6	8-10											90-100	90-100						
Erbsen/ Kefen	15.3	15.4	10-20										65-100	65-100							

→ Die Erntedauer bei Stangenbohnen beträgt 2-3 Monate.

→ Bei Kefen und Erbsen bestimmt die Sorte die Kulturdauer massgeblich: Frühe Sorten brauchen 65-85 d bis Erntebeginn, späte Sorten 75-100 d.

Doldenblütler	frühestes Aussaatdatum			Spätestes Aussaatdatum			Dauer Keimung			Dauer Aussaat bis Pflanzung				Dauer Pflanzung bis Ernte				Dauer Aussaat-Ernte			
	Jan./Feb.	Mär./Apr.	Mai	Juni	Juli	August	Mär./Apr.	Mai	Juni/Juli	August	Sept.	März	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept.			
	Fenchel	15.1	15.7	8-14		6-8W.	4-5W.			8-9W.	7-8W.	6-7W.	7-9W.					12W..			
Bund-/Frühkarotten	28.2	15.3											80-100								
Sommerkarotten	1.4	30.5												80-100	80-100						
Lagerkarotten	1.6	20.6	14-30													110-120					
Knollensellerie	20.3	30.3	14-20		8-10W.				18-21W.												
Stangensellerie	20.3	30.3			8-10W.				10-12W.												
Peterli	1.3	30.7	10-14		8W.	8W.	8W.	8W.	8W.	8W.	8W.	8W.	8-28W.								
Wurzelpeterli	15.3	15.5	10-14											6-7Mt.	6 Mt.						



